



台灣本地山羊 (Taiwan Native Goat)

公羊



台灣本地山羊 (Taiwan Native Goat)

母羊



台灣本地山羊 (Taiwan Native Goat)

全身被毛為黑色或黑褐色，公母羊均有角

台灣本地山羊(Taiwan Native Goat)



◎母羊角型與公羊相似，但角基部較細。
成熟公母羊均有鬍鬚

角長15-25公分，並向後彎曲。耳小而直立或略向外上方傾斜。



台灣本地山羊 (Taiwan Native Goat)

腿部矮短。成熟公羊在頸部，後軀及前後膝上方有粗鋼長毛

台灣本地山羊



生活潑 壴攀岩登高



年輕羊隻沒有鬍鬚

Taiwan Native Goat



母羊全身短毛



公母羊尾部豎立

台灣本地山羊 (Taiwan Native Goat)



早熟，發情季節性變化不明顯

台灣本地山羊 (Taiwan Native Goat)

台灣本地山羊

生長性狀

	公	母
• 出生體重（公斤）	: 2.7 ±0.3	2.6 ±0.5
• 三月齡離乳體重（公斤）	: 13.7 ±1.6	11.9 ±0.7
• 哺乳期間平均每日增重（公斤）	: 0.13±0.03	0.11±0.01
• 生長期飼料效率	: 6.20	—
• 三歲齡成熟體重（公斤）	: 64.1 ±5.4	44.8±5.9
• 三歲齡成熟體重（公斤）	: 31.0 ±4.2*	23.0±4.2*
• 屠宰率（%）	: 48.4	
• 精肉率（%）	: 32.9	*表金門黑山羊

成熟體型測量

	公	母
• 體高（公分）	: 76.2±4.5(56.5±2.1*)	59.3±4.1(51.1±2.2*)
• 體長（公分）	: 88.1±3.6(67.0±1.4*)	67.1±3.8(65.5±4.2*)
• 胸圍（公分）	: 100.0±4.2(78.1±7.1*)	85.4±4.6(69.3±4.4*)
• 陰囊周長（公分）	: 22.5±2.1(20.3±0.4*)	—

台灣本地山羊

繁殖能力

- 產仔率: 161.3% • 產後至回復發情間距 34.6 ± 11.4 天
- 單胎率: 41.9% • 仔公羊開始有配種能力之日齡 135 ± 12.6 天
- 雙胎率: 54.8% • 仔公羊開始有配種能力之體重 19.1 ± 4.0 Kg
- 參胎率: 3.3% • 仔公羊開始有配種能力之陰囊周長 19.4 ± 1.9 Cm

泌乳能力

- 150 日泌乳期中平均每日泌乳量: 0.82 ± 0.37 Kg
- 乳脂率: $5.5 \pm 0.3\%$